



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 50 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

ENFERMEIRO

11 - Um paciente que se submete a uma raquianestesia pode apresentar, como complicação precoce, hipotensão arterial. Nesse caso, é recomendável, dentre outras medidas, colocar o paciente na seguinte posição:

- a) prona
- b) supina
- c) jackknife
- d) trendelenburg

12 - A cirurgia que inclui a histerectomia abdominal com linfadenectomia pélvica seletiva é denominada:

- a) Billroth
- b) Wertheim
- c) Manchester
- d) Helter-Lind

13 - O bisturi elétrico é um aparelho que produz no corpo humano os seguintes efeitos:

- a) oxigenação e pasteurização
- b) fulguração e impregnação
- c) congelação e oxidação
- d) coagulação e dissecação

14 - Para o enfermeiro, "respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente" constitui:

- a) dever ético
- b) valor religioso
- c) prática sugerida
- d) opção institucional

15 - A síndrome da membrana hialina compromete primariamente o seguinte sistema:

- a) geniturinário
- b) respiratório
- c) digestivo
- d) nervoso

16 - Para atender à prescrição médica de 6 mg de dexametasona, deve-se retirar do frasco de 2,5 ml, contendo 4 mg/ml, o volume equivalente a:

- a) 2,5 ml
- b) 2,0 ml
- c) 1,5 ml
- d) 1,0ml

17 - Durante as palestras para os pacientes matriculados no Programa de Diabetes, a enfermeira vem enfatizando as complicações decorrentes dessa patologia, como a retinopatia, responsável por 90% dos casos de cegueira nos diabéticos insulino-dependentes. Para os diabéticos do tipo II, uma das causas mais frequentes de cegueira é:

- a) uveíte
- b) glaucoma
- c) presbiopia
- d) cetoacidose

18 - Cateterismo vesical e preparo de medicações endovenosas são exemplos de técnicas:

- a) de isolamento
- b) contaminadas
- c) assépticas
- d) limpas

19 - Um paciente em uso de grande quantidade de furosemida, diurético perdedor de potássio, começou a apresentar hipocalcemia, que pode ser detectada através dos seguintes sintomas:

- a) fraqueza muscular e bromidrose
- b) polifagia e náuseas
- c) vômitos e anúria
- d) fadiga e anorexia

20 - L.S.I., sexo feminino, 76 anos, está internada com diagnóstico de pneumonia, com acesso venoso periférico e cateter vesical. Para diminuir o risco de sépsis neste paciente, o enfermeiro deve adotar a seguinte conduta:

- a) isolar o paciente
- b) trocar o acesso venoso
- c) monitorar os acessos invasivos
- d) fazer rígida monitoração cardíaca

21 - J.A. P., sexo masculino, 56 anos, fumante, é internado com diagnóstico de IAM, com dor precordial intensa e muito ansioso. A prioridade máxima no atendimento a este paciente é:

- a) aliviar a dor precordial
- b) verificar os sinais vitais
- c) manter em posição de Jackknife
- d) preparar material de emergência

22 - O cateterismo vesical é um dos mais importantes fatores de risco para a infecção hospitalar. Como medida preventiva, a atitude mais indicada do enfermeiro é:

- a) trocar o cateter a cada 7 dias
- b) usar luva ao abrir o sistema fechado
- c) substituir a drenagem aberta a cada 24 horas
- d) lavar as mãos sempre que manipular o sistema

23 - O controle de infecção hospitalar é uma das grandes preocupações das autoridades de saúde. Em 1983, o Ministério da Saúde baixou a primeira Portaria tornando obrigatória a constituição de comissões de controle de infecção hospitalar nas instituições de saúde. A Portaria atual, que está normatizando essas comissões, é a de número:

- a) 196
- b) 930
- c) 2.616
- d) 2.960

24 - A ação da fototerapia é transformar a bilirrubina indireta em biliverdina, para ser eliminada pela urina. Embora seja um procedimento relativamente simples, requer mais atenção da enfermagem, principalmente em relação ao seguinte cuidado com o recém-nascido:

- a) colocar proteção ocular
- b) manter em decúbito dorsal
- c) posicionar a lâmpada a 20cm
- d) proteger os testículos com fraldas

25 - A eliminação de mecônio no útero indica sofrimento fetal e ocorre em cerca de 10 a 20% de todas as gestações. A aspiração de mecônio obstrui mecanicamente as vias aéreas e tem, como uma das complicações, o pneumotórax. Um cuidado de enfermagem nessa situação é:

- a) manter sonda gástrica fechada
- b) fazer lavagem gástrica no recém-nascido após o parto
- c) colocar o recém-nascido em posição de trendelenburg
- d) controlar a frequência respiratória e o padrão respiratório

26 - Para infundir 2.500ml de soro fisiológico a 0,09%, de acordo com a prescrição médica, a enfermeira programou a bomba infusora para administrar 105 ml por hora, o que corresponde, por minuto, ao seguinte número de gotas:

- a) 17
- b) 24
- c) 35
- d) 40

27 - Durante a realização de exame físico, a enfermeira detectou lipodistrofia na paciente P.L.C., internada há um mês para tratamento de *diabetes mellitus*. Frente a esta situação, reuniu a sua equipe, orientando-a quanto à importância da seguinte conduta no tratamento com insulina por via subcutânea:

- a) colocar gelo após aplicar a injeção
- b) friccionar prolongadamente o local
- c) fazer rodízio dos locais de aplicação
- d) orientar a paciente para fazer exercícios físicos

28 - Ao fazer a remessa de imunobiológicos de um nível a outro, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda, entre outros cuidados:

- a) proporcionar contato direto entre o gelo e os imunobiológicos
- b) circundar os imunobiológicos com gelo reciclável ou com o gelo em sacos plásticos
- c) manter sempre a proporção de 2/3 de gelo para 1/3 de imunobiológicos na caixa térmica
- d) transportar as vacinas e os soros em caixas de papelão, acondicionadas em caixa térmica sem gelo

29 - Nos locais em que não há coleta de lixo hospitalar sistemática, os imunobiológicos vencidos devem receber o seguinte pré-tratamento, antes de serem inutilizados:

- a) esterilizados em autoclaves ou estufas
- b) acondicionados em saco plástico vermelho
- c) desprezados na pia do expurgo com água corrente
- d) colocados em solução desinfetante por 15 minutos

30 - O frasco multidoses da vacina tríplice (DPT), uma vez aberto, mantido sob temperatura adequada, e adotados os cuidados que evitem sua contaminação, pode ser utilizado durante um período de:

- a) 02 dias
- b) 05 dias
- c) 07 dias
- d) 10 dias

31 - S.P.L., gesta 1, para zero, no 5º mês de gestação dirigiu-se ao Posto de Saúde para obter informações a respeito da antitetânica, já que nunca tomou a referida vacina. A enfermeira que a atendeu orientou a paciente para:

- a) retornar ao Posto de Saúde no 8º mês de gestação
- b) iniciar a vacinação com o toxóide tetânico 20 dias antes do parto
- c) tomar a 1ª dose o mais precocemente possível e a 2ª dose após um intervalo de 2 meses
- d) começar a imunização no 9º mês de gravidez e completar o esquema 1 mês após o parto

32 - As estatísticas evidenciam que um dos principais motivos de atendimento nos serviços de emergência e que também se constitui numa das principais causas externas de mortalidade na adolescência é:

- a) afogamento
- b) abuso sexual
- c) acidente de trânsito
- d) doença sexualmente transmissível

33 - A adolescência é uma etapa evolutiva muito peculiar do ser humano. A melhor forma de defini-la é:

- a) fase de transição entre a infância e a idade adulta, que se inicia com a aquisição de sistemas de valores pessoais
- b) momento da vida humana que se caracteriza pelo crescimento esquelético e pelo o amadurecimento da função reprodutora
- c) período de vida compreendido entre 12 e 19 anos, caracterizado por intenso crescimento e capacidade de assumir compromissos sociais
- d) processo que envolve os fenômenos físicos da puberdade e as transformações psicossociais por que passa o ser humano, no auge do seu processo maturativo

34 - A prova tuberculínica é utilizada como método auxiliar de diagnóstico da tuberculose em pessoas não vacinadas com BCG. A sua leitura é realizada, medindo-se o maior diâmetro transverso da área de induração palpável. Quando o resultado da leitura corresponde a 7 mm, indica que o indivíduo é:

- a) não reator, ou seja, não infectado pelo bacilo da tuberculose ou analérgico
- b) reator fraco, ou seja, infectado pelo bacilo da tuberculose ou por outras micobactérias
- c) reator forte, ou seja, infectado pelo bacilo da tuberculose, que pode estar doente ou não
- d) reator muito forte, ou seja, infectado pelo bacilo da tuberculose e com a doença em atividade

35 - Para um paciente com diagnóstico de tuberculose pulmonar que nunca se submeteu a quimioterapia antituberculosa está indicado o "Esquema I" para tratamento, conforme orientação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Portanto, esse paciente fará uso dos seguintes medicamentos:

- a) etionamida, sulfametoxazol e estreptomicina
- b) etambutol, estreptomicina e etionamida
- c) isoniazida, etambutol e pirazinamida
- d) rifampicina, isoniazida e pirazinamida

36 - Para o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, o termo comunicante refere-se a:

- a) pessoa, parente ou não, que coabita com um doente de tuberculose
- b) paciente com tuberculose que já está sob tratamento e controle do Programa
- c) todo o indivíduo que tem o diagnóstico de tuberculose confirmado por baciloscopia ou cultura
- d) doente com tuberculose que nunca usou ou usou por menos de um mês drogas antituberculosas

37 - Recentemente alguns casos confirmados de febre amarela colocaram em alerta as autoridades de saúde e mobilizaram a população que se dirigiu aos Centros de Saúde em busca da imunização contra a doença. A vacinação é realizada em dose única, através da seguinte via de administração:

- a) oral
- b) subcutânea
- c) intradérmica
- d) intramuscular

38 - A exsangüineotransfusão é um procedimento realizado em recém-nascidos, através do qual pequenas quantidades de sangue são retiradas e repostas, com sangue de doador compatível, até que seja reposto volume de troca igual a um ou dois volumes sangüíneos. Uma das finalidades desse procedimento é:

- a) aumentar os níveis de bilirrubina no sangue
- b) reduzir os fatores de coagulação
- c) tratar as doenças cardíacas
- d) corrigir anemias severas

39 - As novas diretrizes da Saúde Mental recomendam:

- a) acabar com as internações psiquiátricas
- b) levar em conta toda a existência/sofrimento da pessoa e não apenas situações caracterizadas como doença
- c) aumentar o número de leitos hospitalares em psiquiatria, a fim de atender à demanda crescente de cuidados nessa área
- d) criar hospitais psiquiátricos para atendimento à infância, pois é nessa faixa etária que os problemas habitualmente têm início

40 - Dos instrumentos do enfermeiro que atua em psiquiatria, o mais importante é:

- a) a pessoa do enfermeiro - o uso que faz de si mesmo ao lidar com o cliente
- b) a comunicação verbal - é fundamental auxiliar o cliente a verbalizar o que sente, para que possa trabalhar com ele
- c) a interação em grupo - como muitos clientes têm dificuldade em se expressar, são beneficiados pela fala dos colegas
- d) a orientação - o cliente psiquiátrico muitas vezes não tem noção do que é certo ou errado, não sabe o que deve fazer, dizer, necessitando constantemente de orientação

41 - Um dos mais importantes papéis do enfermeiro em psiquiatria é a manutenção de um ambiente terapêutico na unidade. Manter um ambiente terapêutico implica em:

- a) reduzir os riscos ao mínimo
- b) oferecer muitas atividades, mantendo os clientes sempre atarefados
- c) proporcionar conforto e limpeza, permitindo que os pacientes se sintam bem
- d) estimular as habilidades e capacidades emergentes de todos os seus participantes

42 - Muitos transtornos fisiológicos têm causas emocionais, constituindo a área conhecida como "psicossomática" cujo significado é o seguinte:

- a) são transtornos que dependem do sistema nervoso autônomo, não provocando alterações orgânicas
- b) são problemas que refletem claramente uma necessidade de atenção por parte dos clientes; seu tratamento é psicológico
- c) são problemas que decorrem da raiva reprimida, que, não tendo outra forma de expressão, atinge o organismo fisicamente
- d) são transtornos nos quais os fatores emocionais exercem um papel importante, afetando o organismo; exigem tratamento tanto para os problemas físicos, como para os psíquicos

43 - Um cliente cujo diagnóstico é "transtorno afetivo bipolar" apresenta-se hiperativo, eufórico, por vezes exaltado. Acorda cedo, anda muito, interfere no que os outros estão fazendo e dá ordens a todos. O enfermeiro deverá:

- a) orientar os auxiliares no sentido de que insistam para que o cliente repouse, pois visivelmente está tendo um grande desgaste físico
- b) propor à equipe impor limites precisos, rígidos às ações do cliente, pois sua tendência é se exaltar cada vez mais
- c) discutir e trabalhar, com a equipe auxiliar, os sentimentos que este cliente provoca
- d) determinar a imediata contenção deste cliente toda vez que ultrapassar os limites

44 - Um paciente usuário de um Centro de Atenção Psicossocial apresenta-se extremamente ansioso, andando de um lado para o outro, levando as mãos à cabeça e suando. Indagado, diz não saber por que está assim. Recomenda-se que a equipe de enfermagem adote, em relação ao paciente, a seguinte conduta:

- a) fique próxima a ele e administre a medicação prescrita, sem reprimir sua manifestação de ansiedade
- b) procure acalmá-lo, dizendo que não se preocupe, uma vez que ele próprio diz não haver motivo para isso
- c) insista na pergunta sobre a causa de sua ansiedade, a fim de ajudá-lo a tomar providências quanto à mesma
- d) administre a medicação prescrita e leve-o à terapia ocupacional, para que, realizando atividades, esqueça seus problemas

45 - Uma cliente recém-internada no hospital psiquiátrico procura isolar-se e evita o contato, permanecendo deitada em seu leito, coberta até a cabeça. Nessa situação, a equipe de enfermagem deve agir da seguinte maneira:

- a) retirar o lençol que cobre seu rosto, para poder estabelecer relação com ela
- b) permanecer por algum tempo ao seu lado, aceitando sua atitude e procurando estabelecer contato
- c) administrar a medicação prescrita, explicando, a seguir, que ela deve sair do leito para fazer o tratamento
- d) manter atitude firme para que ela saia do leito, a fim de participar das atividades de terapia ocupacional

46 - O Sr. J.P.L., 40 anos, chega à instituição hospitalar com o membro superior esquerdo totalmente queimado. Baseado na regra dos nove, o enfermeiro conclui que o percentual da área comprometida foi de:

- a) 9 %
- b) 18%
- c) 27%
- d) 36%

47- Após laparotomia exploradora, um paciente apresentou choque hipovolêmico. Os sintomas indicativos desta anormalidade são:

- a) sede, anúria e hipertensão
- b) taquicardia, hipotensão e palidez
- c) extremidades frias, estertores e afasia
- d) pulso rápido, nistagmo e obnubilação

48 - No traumatismo renal, a manifestação mais comum e que sugere a possibilidade de lesão renal é:

- a) hipertermia
- b) hematúria
- c) cianose
- d) hipóxia

49 - A conduta imediata do enfermeiro, quando um paciente em uso de concentrado de hemácias apresenta uma reação hemolítica, deve ser:

- a) suspender a transfusão
- b) administrar anti-histamínico
- c) reduzir a velocidade da infusão
- d) posicionar o paciente em Trendelenburg

50 - O diurético osmótico administrado no paciente com hipertensão intracraniana, visando a redução do volume do conteúdo craniano, é:

- a) manitol
- b) pavulon
- c) higraton
- d) aminofilina