



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

INSTRUÇÕES:

Você receberá do fiscal: um **caderno de questões** e um **cartão de respostas** personalizado.
As páginas do **caderno de questões** estão numeradas sequencialmente e contêm 50 questões.

ATENÇÃO !

- 1 - Verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- 2 - Verifique no verso do **cartão de respostas**, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento e cargo para o qual concorre estão corretos.
- 3 - Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a opção que a responde corretamente.
- 4 - Observe as recomendações impressas no **cartão de respostas**.
- 5 - Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do **chefe de local**.
- 6 - Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, inclusive a marcação do **cartão de respostas**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**.
- 7 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado** no verso.

CALENDÁRIO PREVISTO

Divulgação do Gabarito - 04/06/2000

Prazo de Recurso - 05 e 06/06/2000

Dirigir o pedido de revisão ao Coordenador Geral do Concurso e entregá-lo no Protocolo da FMS, Av. Amaral Peixoto, 171, 4º andar - Centro - Niterói.

Obs.: Não serão recebidos recursos em local diverso do acima referido.



Realização

Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1 - À concepção do Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelo poder do Estado, corresponde:

- a) uma noção autoritária de política social que bloqueia o direito à livre organização do trabalho em saúde em um contexto de cidadania restrito
- b) uma noção socialista de que a atenção à saúde deve ser estatal em um contexto de cidadania restrito
- c) uma noção centralizadora e vertical de Estado como gestor único das políticas de saúde em um contexto de cidadania regulada
- d) uma noção de Estado de bem-estar em que direitos sociais são elemento essencial em um contexto de cidadania plena

2 - O modelo médico assistencial dominante nos anos 70 caracterizou-se, principalmente, pela oferta de serviços de saúde da seguinte forma:

- a) universal à população brasileira, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional da Previdência Social
- b) prioritário às populações urbanas, através da compra de serviços privados por meio das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde
- c) prioritário às populações inseridas no mercado de trabalho formal, através da compra de serviços privados por meio do Instituto Nacional de Previdência Social
- d) universal à população brasileira pelo Ministério da Saúde, complementado através da compra de serviços privados para os trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal

3 - A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como:

- a) resultado do acesso do cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos
- b) resultado da organização social da produção, abrangendo diversos aspectos das condições de vida
- c) um completo estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não simplesmente a ausência de doença
- d) um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas características psíquicas

4 - A Lei 8.080, sobre o Sistema Único de Saúde, pode ser considerada insatisfatória no seguinte aspecto:

- a) a população está excluída dos fóruns de discussão e decisão, mantidas as antigas estruturas decisórias nas mãos de grupos fechados nos gabinetes do Estado
- b) a estrutura proposta para o SUS termina por manter a antiga dicotomia ações preventivas x ações curativas
- c) a proposta de descentralização é frágil e não permite a quebra da tradição brasileira de centralização de decisões em nível federal
- d) as relações políticas e financeiras do SUS com o chamado sistema de atenção médica supletiva não foram regulamentadas

5 - Segundo a Norma Operacional Básica 96 (NOB) do Ministério da Saúde, gerência é definida como:

- a) a direção de um sistema de saúde municipal, estadual ou nacional
- b) a administração de uma unidade ou órgão de saúde prestador de serviços ao SUS
- c) a administração de uma unidade ou órgão de saúde ou a direção de um sistema de saúde municipalizado
- d) a direção de órgãos coordenadores de atividades de saúde no nível municipal, como a Vigilância Epidemiológica e a Vigilância Sanitária

6 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de Atenção Básica (PAB) é:

- a) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no nível de atenção primária
- b) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada município
- c) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente para ser oferecido gratuitamente à população
- d) um montante financeiro definido por um valor *per capita* multiplicado pela população de cada estado e por este redistribuído aos municípios

7 - A condição essencial para um município obter gestão plena do sistema de saúde municipal é apresentar:

- a) um Conselho Municipal de Saúde organizado
- b) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos nos níveis primário e secundário
- c) um plano de consórcio com municípios vizinhos, para oferecer uma rede de serviços completa à população
- d) uma rede de prestação de serviços própria, pelo menos em no nível primário, podendo conveniar e credenciar os níveis mais complexos

8 - A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos serviços de saúde na condução do SUS tem como objetivo explícito:

- a) incrementar a participação e controle social
- b) economizar gastos com recursos humanos
- c) disciplinar, controlar e reprimir a população
- d) economizar gastos com infra-estrutura de saneamento

9 - O enfoque epidemiológico no modelo de atenção à saúde proposto pela Norma Operacional Básica 96 recomenda aos municípios que:

- a) restrinjam as ações de saúde àquelas de cunho estritamente preventivo, pois são muito mais eficazes
- b) identifiquem grupos de risco em cada município, para a eventualidade de ser necessário isolá-los em quarentena
- c) privilegiem as ações de saúde centradas no meio ambiente, na qualidade de vida e na noção de atenção integral à saúde
- d) notifiquem a emergência de epidemias em seu território à Fundação Nacional de Saúde, para que esta proceda a campanhas de imunização

10 - Segundo a Norma Operacional Básica 96, a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter, como foco principal, uma ética pautada por:

- a) lógica política vigente em cada município
- b) princípios básicos do código de ética médica
- c) proposta coletiva que transcende o individual
- d) padrões regionais definidos nas constituições estaduais

OTORRINOLARINGOLOGISTA

11 - A amplificação do som exercida pela orelha média faz com que este tenha um aumento real de:

- a) 26 db
- b) 28 db
- c) 30 db
- d) 32 db

12 - A relação de superfície entre a membrana timpânica e a platina do estribo é de:

- a) 15/1
- b) 17/1
- c) 19/1
- d) 21/1

13 - A infecção da orelha externa causada por fungos, tendo como principal sintoma o prurido, é denominada de:

- a) otohematoma
- b) otomicose
- c) exostose
- d) osteoma

14 - A infecção da pele do pavilhão auricular causada pelo estreptococcus, onde se observa eritema com edema e bordas bem definidas, com fenômenos toxiinfeciosos bem evidentes, são características de:

- a) eczema
- b) impetigo
- c) erisipela
- d) furúnculo

15 - A causa mais comum de otalgia reflexa é a:

- a) artralgia da articulação temporomandibular
- b) artralgia da articulação cricoaritenóidea
- c) nevralgia do glossofaringeo
- d) nevralgia do trigêmeo

16 - A dose diária inicial de fluoreto de sódio indicada no tratamento clínico da otospongiose coclear é de:

- a) 25mg
- b) 50mg
- c) 75mg
- d) 100mg

17 - A migração de epitélio escamoso estratificado do meato acústico externo, para dentro da orelha média através de uma perfuração já existente da membrana timpânica, é característica clínica de:

- a) glomus timpânico
- b) fibroma ossificante
- c) hidrocefalia otogênica
- d) colesteatoma secundário

18 - A forma mais freqüente de otospongiose, na qual focos de neoformação óssea na cápsula óssea labiríntica coexistem sem qualquer sintomatologia, denomina-se:

- a) clínica
- b) coclear
- c) vestibular
- d) histológica

19 - A hipoacusia progressiva que se torna evidente entre os 4 e 6 anos de idade, acompanhada de vertigem e retinite pigmentosa, é característica da doença conhecida como síndrome de:

- a) Usher
- b) Bruns
- c) Alport
- d) Costen

20 - Dentre as complicações intracranianas das otites médias, a mais comum, e a que mais freqüentemente leva à morte, é a :

- a) abscesso cerebral
- b) abscesso cerebelar
- c) meningite otogênica difusa
- d) meningite otogênica localizada

21 - A via de eleição de acesso ao meato acústico interno, sempre que a audição não possa ser conservada ou que a doença exija via mais ampla que a da fossa média craniana, é a :

- a) translabiríntica
- b) retrolabiríntica
- c) transvestibular
- d) transgimóide

22 - Quando se suspeita de uma fístula perilinfática espontânea, o paciente deve ser submetido a:

- a) otoscopia
- b) miringotomia
- c) colocação de carretel
- d) timpanotomia exploradora

23 - As estruturas protetoras encontradas no vestíbulo nasal são denominadas de:

- a) fibrilas
- b) vibrissas
- c) ragádias
- d) flagelos

24 - Dentre as conchas que formam a parede lateral das fossas nasais, a que é um osso independente é a:

- a) supremo
- b) superior
- c) inferior
- d) médio

25 - A intradermorreação de Montenegro é utilizada no diagnóstico da seguinte granulomatose nasal:

- a) tuberculose
- b) leishmaniose
- c) blastomicose
- d) rinosporidiose

26 - A interpretação errônea de uma sensação olfativa (perversão do olfato) denomina-se:

- a) hiperosmia
- b) hiposmia
- c) cacosmia
- d) parosmia

27 - A obstrução nasal é o principal sintoma de hipertrofia da tonsila denominada:

- a) lingual
- b) tubária
- c) faríngea
- d) palatina

28 - O local onde mais comumente ocorrem as hemorragias nasais é conhecido como zona de Kiesselbach ou área de :

- a) Tumarkin
- b) Breschet
- c) Hilger
- d) Little

29 - Corrimento nasal após traumatismo craniano é suspeita diagnóstica de :

- a) rinite atrófica
- b) fístula liquórica
- c) granuloma septal
- d) acidente vascular

30 - As complicações das infecções sinusais com extensão intracraniana mais comuns são de origem do seio:

- a) frontal
- b) maxilar
- c) etmoidal
- d) esfenoidal

31 - O canal ramificado rodeado de tecido linfóide que é encontrado no pólo superior das tonsilas palatinas de determinadas pessoas, é denominado de seio :

- a) cavernoso
- b) tumoral
- c) venoso
- d) tortual

32 - As ulcerações superficiais em forma de meia-lua (ulcerações de Duguet), que se localizam lateralmente nos pilares anteriores, são características da angina da:

- A) mononucleose infecciosa
- B) febre tifóide
- C) rubéola
- D) varíola

33 - O exame que indica que o paciente apresenta antitoxina diftérica circulante é conhecido como reação de:

- a) Schick
- b) Látex
- c) ASO
- d) PCR

34 - A ulceração de uma das tonsilas palatinas, recoberta por exsudato pseudomembranoso, cujo agente etiológico é a associação do bacilo fusiforme com o espirilo caracteriza a angina de :

- a) Ludwig
- b) Schultze
- c) Plaut Vincent
- d) Klebs Löffler

35 - Num exame eletrococleográfico de um paciente com disacusia de transmissão, a forma de onda encontrada é :

- a) normal
- b) difásica
- c) alargada
- d) dissociada


36 - Os testes de Schwabach e de Rinne de paciente que apresenta hipoacusia de transmissão na orelha direita estarão, em relação à mesma orelha, respectivamente:

- a) encurtado e positivo
- b) encurtado e negativo
- c) prolongado e positivo
- d) prolongado e negativo

37 - Dentre as provas abaixo, a que é utilizada para investigar o fenômeno de recrutamento é a de:

- a) Rins
- b) SISI
- c) Gelle
- d) Weber


38 - Observe o gráfico abaixo:



A curva nele representada é do tipo:

- a) mista
- b) neural
- c) condutiva
- d) neurosensorial

39 - Observe o gráfico abaixo:



A curva nele representada é do tipo :

- a) Ad e C
- b) Ad e B
- c) An e C
- d) An e B

40) Pelo teste do fluxo salivar, a descompressão cirúrgica do nervo facial está indicada quando a diferença do fluxo entre o lado normal e o paralisado for maior do que:

- a) 10%
- b) 20%
- c) 30%
- d) 40%

41 - O processo de adaptação que o epitélio respiratório sofre em nível da prega vocal verdadeira denomina-se:

- a) aplasia
- b) displasia
- c) metaplasia
- d) hiperplasia

42 - Numa eletrônistagmografia de um indivíduo normal, o nistagmo que se inscreve com os olhos fechados é, em relação ao que se registra com os olhos abertos, de:

- a) menor amplitude e maior velocidade
- b) maior amplitude e menor velocidade
- c) maior amplitude e velocidade
- d) menor amplitude e velocidade

43 - O único teste de função labiríntica capaz de estimular separadamente cada canal lateral é conhecido como:

- a) prova calórica
- b) prova rotatória
- c) pastreio pendular
- d) vectoeletronistagmografia

44 - Quando suspeitamos que um recém-nascido apresenta uma anomalia congênita na laringe, o meio semiológico mais eficaz para confirmação diagnóstica é a:

- a) radiografia simples
- b) laringoscopia direta
- c) laringoscopia indireta
- d) radiografia contrastada

45 - A inervação motora de todos os músculos da laringe, com exceção do cricotireóideo, é dada pelo nervo laríngeo:

- a) superior
- b) inferior
- c) externo
- d) interno

46 - Criança em bom estado geral, que acorda de madrugada com agitação intensa, fácies de angústia, tosse ou choro enrouquecidos, respiração difícil, dando a impressão de morte iminente, sugere o diagnóstico de laringite :

- a) catarral
- b) estridulosa
- c) hipertrofica
- d) fusoespiralar

47 - O tumor maligno mais comum na laringe é o:

- a) espinocelular
- b) basocelular
- c) condroma
- d) sarcoma

48 - O tumor benigno mais comum de glândula salivar, especialmente de parótida, é o:

- a) pleomórfico
- b) papilífero
- c) cístico
- d) acinar

49 - A causa mais comum de fístula salivar é de origem:

- a) viral
- b) idiopática
- c) traumática
- d) infecciosa

50 - Dentre as parotidites crônicas, a que tem maior potencial para levar à formação de fístulas é a:

- a) listeriose
- b) brucelose
- c) actinomicose
- d) toxoplasmose